



**МОЌ И  
КОНТРОЛА**

# Skopryl<sup>®</sup> Combo

lisinopril/amlodipine

таблети од 10 mg/5 mg, од 20 mg/5 mg и од 20 mg/10 mg



АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравјето ѝрег сѐ*



# SKOPRYL<sup>®</sup> — ПОВЕЌЕ ОД 30 ГОДИНИ УСПЕШНА ПРИКАЗНА ВО 14 ЗЕМЈИ

- Russia
- Romania
- Armenia
- Jordan
- Slovenia
- Bulgaria



- Macedonia
- Serbia
- Croatia
- Montenegro
- Bosnia & Hercegovina
- Kosovo
- Albania



# 2018 ESC/ESH Clinical Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension

Се препорачува  
иницијалната  
анти-хипертензивна  
терапија да започне со  
фиксна комбинација



**Skopryl® Combo**



АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравјето ѝ пред сè*

## Changes in recommendations



**2013**

**2018**

### Initiation of drug treatment

Initiation of antihypertensive therapy with a two-drug combination may be considered in patients with markedly high baseline BP or at high CV risk.

### Initiation of drug treatment

It is recommended to initiate an antihypertensive treatment with a two-drug combination, preferably in a SPC. The exceptions are frail older patients and those at low risk and with grade 1 hypertension (particularly if SBP is < 150 mmHg).

### Resistant hypertension

Mineralocorticoid receptor antagonists, amiloride, and the alpha-1 blocker doxazosin should be considered if no contraindication exists.

### Resistant hypertension

Recommended treatment of resistant hypertension is the addition of low-dose spironolactone to existing treatment, or the addition of further diuretic therapy if intolerant to spironolactone, with either eplerenone, amiloride, higher-dose thiazide/thiazide-like diuretic or a loop diuretic, or the addition of bisoprolol or doxazosin.

### Device-based therapy for hypertension

In case of ineffectiveness of drug treatment, invasive procedures such as renal denervation and baroreceptor stimulation may be considered.

### Device-based therapy for hypertension

Use of device-based therapies is not recommended for the routine treatment of hypertension, unless in the context of clinical studies and RCTs, until further evidence regarding their safety and efficacy becomes available.

### Recommendation Grading

Grade I


Grade IIa

Grade IIb

Grade III



# Core drug-treatment strategy for uncomplicated hypertension



*The core algorithm is also appropriate for most patients with HMOD, cerebrovascular disease, diabetes, or PAD*



# Клинички искуства





Ефикасност и безбедност на  
лизиноприл/амлодипин (Л/А)  
фиксна комбинација кај  
пациенти со есенцијална  
хипертензија (ALFESS студија)

Farsang Csaba, Abraham Gyorgy, Kovacs Peter,  
Karanyi Zsolt, Ofner Peter; Hypertension and  
nephrology 2009; 13 (2): 81-88

**Skopryl® Combo**



АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравјеѝто ѝрег сѝ*



## РЕЗУЛТАТИ

- Сите параметри кои ја опишуваа ефикасноста (КП мерен во ординација, КП мерен со холтер и квалитет на живот) беа значајно подобрани до крајот на 12-та недела кај пациенти со прв и втор степен на примарна хипертензија, претходно неуспешно третирани со АСЕ-инхибитори и/или Са-блокатори.
- Кај 31.9 % од пациентите било потребно да се зголеми почетната доза од 10 mg лизиноприл и 5 mg амлодипин на две таблети дневно.
- Споредено со претходниот третман, терапијата со Л/А дала значајно подобри резултати, односно терапевска ефикасност е постигната кај 92 % од пациентите.
- Одлична толеранција на комбинацијата Л/А е регистрирана кај 94 % од пациентите.



# Skopryl® Combo



АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравјето ѝ пред сè*





Journal of  
**Hypertension**

Official journal of the ISH & ESH



European  
Society of  
Hypertension

# EFFECTS OF THE COMBINATIONS OF AMLODIPINE WITH AN LISINOPRIL OR A CARVEDILOL IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY

Bubnova, M.; Aronov, D.; Vygodin, V.

Journal of Hypertension: [July 2019 - Volume 37 - Issue - p e173-e174](#)

doi: 10.1097/01.hjh.0000572224.73513.a7

# Skopryl® Combo



АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравје го љуби пред сè*



## РЕЗУЛТАТИ

- Третманот со Л/А покрај регулирање на крвниот притисок покажува и додатен плеотропен ефект.
- Во студијата е постигнато сигнификантно подобрување на испитуваните глико-липидни параметри кај пациентите со хипертензија и прекумерна телесна тежина.

**Skopryl® Combo**




АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравјето ѝ пред сè*



# КОМБИНАЦИЈАТА Л/А СИГНИФИКАНТНО ГО ПОДОБРУВА ГЛИКО-ЛИПИДНИОТ МЕТАБОЛИЗАМ





## ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

- Терапија на есенцијална хипертензија кај возрасни лица.
- Скоприл Комбо е индициран како супституциона терапија за возрасни пациенти со висок крвен притисок, којшто претходно бил регулиран со истовремена примена на лизиноприл и на амлодипин, дадени во еднакви дози соодветни на јачината на Скоприл Комбо.

**Skopryl® Combo**



АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравјето ѝ пред сè*



## ДОЗИРАЊЕ

- Се препорачува една таблета на ден.
- Скоприл Комбо е индициран само кај пациенти кај кои оптималната доза на одржување на лизиноприл и на амлодипин е титрирана до:
  - 10 mg и 5 mg во случај на Скоприл Комбо 10 mg/5 mg
  - 20 mg и 5 mg во случај на Скоприл Комбо 20 mg/5 mg
  - 20 mg и 10 mg во случај на Скоприл Комбо 20 mg/10 mg

**Skopryl® Combo**



АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравјето ѝ ег сè*



## ДОЗИРАЊЕ

- Храната не влијае врз апсорпцијата на лекот.
- Скоприл Комбо може да се зема независно од оброците.
- Разделната линија е присутна за да го олесни кршењето на таблетата заради полесно проголтување, а не да ја подели таблетата на две еднакви дози.
- Доколку е потребно да се приспособи дозата, може да се земе предвид титрација на дозата со поединечните компоненти.



# Skopryl® Combo



АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ

*Здравјето ѝ пред сè*



# ПАКУВАЊЕ

табл. 10 mg/ 5 mg x 30

табл. 20 mg/ 5 mg x 30

табл. 20 mg/ 10 mg x 30

